

バミューダグラス

モナコ

Seed Trader  
**Benidai**



# MONACO TURF-TYPE BERMUDAGRASS

リビエラの伝説を引き継ぐ  
ハイエンドバミューダグラス!



**MONACO**  
BERMUDAGRASS

- 芝質に優れ、ハイクオリティなターフの造成が可能
- 葉色は濃緑色で、  
年間を通して密度の高いターフを形成することが可能
- 強靱な耐寒性により春の芽出しが早く、秋の色持ちも抜群
- 旺盛な造成速度を持ち、ディボット等の各種損傷からの回復が早い
- イエロージャケットコートにより  
発芽・初期生育が早く、早期の造成が可能



ターフタイプ(芝生型) バミューダグラス

モナコ

Seed Trader  
Benidai

## NTEP—芝草評価試験結果

■乾燥ストレス下での葉色、春の芽出し、葉の細さ、季節ごとの芝質評価試験(試験地:テキサス州カレッジステーション)

※当試験地は温暖湿潤気候に属し、北海道、東北の内陸部や本州東部の高原地帯・沖縄を除く日本の大部分が該当

| 品種名                | 遺伝的<br>葉色 | 春の<br>芽出し | 葉の<br>細さ | 冬期<br>葉色 | 冬期葉色<br>(11月) | 冬期葉色<br>(12月) | 芝質  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |           |           |          |          |               |               | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 平均値 |
| MONACO             | 6.8       | 4.8       | 5.9      | 3.8      | 6.3           | 3.7           | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
| TIFWAY             | 7.3       | 6.0       | 7.2      | 4.0      | 7.3           | 5.7           | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 |
| PRINCESS 77        | 6.0       | 5.0       | 6.3      | 4.5      | 6.0           | 4.7           | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 5.4 |
| RIVIERA            | 5.6       | 4.3       | 5.6      | 3.3      | 4.7           | 3.7           | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.0 | 5.1 |
| YUKON              | 6.0       | 5.0       | 5.4      | 3.3      | 6.3           | 3.0           | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 5.1 |
| RIO                | 5.8       | 4.0       | 5.1      | 3.8      | 5.0           | 2.7           | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.0 | 5.0 |
| NORTH<br>SHORE SLT | 5.9       | 5.2       | 5.1      | 3.4      | 5.0           | 3.7           | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | 3.3 | 4.7 |
| NUMEX-<br>SAHARA   | 5.3       | 4.5       | 4.7      | 4.3      | 4.3           | 3.3           | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.0 | 4.5 |

## 超速発芽促進コーティング イエロージャケットコート

YELLOW JACKET  
ENHANCED SEED COATINGコート材の主基材は  
コーンスターチ(デンプン)を原料としており、  
環境負荷が低く生分解性です。

## 吸水・保水能力

コーティング材の吸水素材は分解するまでの間、最大で自重の約600倍もの水分を吸水・保持し、種子へと供給します。一般的なコーティング処理において、ピシウム菌による立ち枯れ病防止のために含まれる殺菌剤についても、水分と同様に保持されます。この効果は約3週間となり一般的なコーティング処理方法と比較し長期間持続します。

## 粘性による活着率向上!

コーティング材が吸水状態で独特の粘性を発生させ、発芽までの期間の種子の余計な動きを減少させる事ができます。  
発芽した個体の活着率が減少する原因として発芽状態となった種子の余計な動きが一因としてありますが、イエロージャケットコートはこれを大幅に防ぎ、活着率を上げることができます。

## 特長

リビエラの後継品種として開発された、高品質のターフを形成する次世代の最新品種です。

ティフトンレベルの芝質を誇り、年間を通して密度の高いターフを形成することが可能で、ディボット等の各種損傷からの回復も早いことから、ゴルフ場から競技場まで場所を選ばずに使用できます。強靱な耐寒性により、春の芽出しが早く、秋の色持ちも抜群です。

イエロージャケットコートの特性により、発芽・初期生育が早まることで、生種子より早期のターフ形成が可能です。

**播種量** 芝生向けには15～20g/m<sup>2</sup>  
※緑化工事等では施工状況に応じて  
適宜ご使用ください。

**播種期** 4～7月  
※夏季以降、初秋の施工は発芽しますが、  
冬季に枯死する個体が多くなります。

## 種子の標準的な性状

標準発芽率:80% 標準純度:98%  
平均粒数:1,800粒/g(イエロージャケットコート)

【販売店】

【輸入・販売元】

紅大貿易株式会社

〒101-0048 千代田区神田司町2-8-3 第25中央ビル

TEL:03-3256-0551 / FAX:03-3254-7126

E-mail:seed@benidai.co.jp / http://www.benidai.co.jp/

